

# AFTINE<sup>®</sup>

sulfato de neomicina - DCB: 06284  
tartarato de bismuto e sódio - DCB: 00353  
cloridrato de procaína - DCB: 07383  
mentol - DCB: 05643

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

AFTINE<sup>®</sup> suspensão oral gotas - Embalagem contendo um frasco gotejador de 20 mL.

## USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada mL de AFTINE<sup>®</sup> contém:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| neomicina (na forma de sulfato) ..... | 15mg |
| tartarato de bismuto e sódio .....    | 25mg |
| cloridrato de procaína .....          | 15mg |
| mentol .....                          | 1mg  |
| Excipientes q.s.p. ....               | 1mL  |

(sacarina sódica, propilenoglicol, hidróxido de sódio, glicerol, álcool etílico e água purificada)

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AFTINE<sup>®</sup> é eficaz nos casos de aftas e outras afecções bucais. A neomicina combate as bactérias, o tartarato de bismuto e sódio possui ação antisséptica, o cloridrato de procaína atua como anestésico e o mentol age como adstringente.

AFTINE<sup>®</sup> deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

AFTINE<sup>®</sup> possui prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que observados os cuidados de conservação. **Não use o produto se o prazo de validade estiver vencido.**

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe também se estiver amamentando.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico o aparecimento de quaisquer reações desagradáveis.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O sulfato de neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo, bactericida, ativo contra numerosas bactérias Gram-positivas. Atravessa a membrana celular bacteriana mediante transporte ativo e interfere na síntese proteica. A neomicina não é absorvida pela pele intacta, todavia, a neomicina aplicada topicamente é facilmente absorvida através de grandes regiões expostas, queimadas ou com tecido de granulação.

O tartarato de bismuto e sódio possui ação antisséptica direta *in vitro* sobre o streptococo. O streptococo é o agente etiológico único causador destas afecções (angina pultácea).

O cloridrato de procaína possui ação anestésica tópica, aliviando a dor.

O mentol possui ação adstringente.

### INDICAÇÕES

AFTINE<sup>®</sup> é indicado como medicação tópica auxiliar no tratamento das afecções bucais.

### CONTRAINDICAÇÕES

AFTINE<sup>®</sup> não deve ser utilizado por pacientes sensíveis a qualquer um dos componentes da formulação.

### REAÇÕES ADVERSAS

AFTINE<sup>®</sup> não apresentou reações adversas até o momento.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

Instilar uma ou duas gotas no local da afecção, 3 a 6 vezes ao dia.

**Agite antes de usar.**

### PACIENTES IDOSOS

Não constam na literatura relatos sobre advertências ou recomendações especiais do uso adequado por pacientes idosos.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO.**

Farm. Resp.: Dr<sup>a</sup>. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122  
Reg. M.S.: 1.1560.0080

CIFARMA - Científica Farmacêutica Ltda.  
Rod. BR 153 Km 5,5 - Jardim Guanabara  
CEP: 74675-090 - Goiânia / GO  
CNPJ: 17.562.075/0001-69 - Indústria Brasileira